





**SCALIBOR collare** previene le infestazioni da zecche per 6 mesi, da pulci per 4 mesi; previene la puntura dei flebotomi per 5 mesi e repelle le zanzare per 6 mesi. L'effetto repellente (anti-feeding) di SCALIBOR nei confronti dei flebotomi consente di ridurre il rischio di trasmissione di leishmaniosi viscerale nel cane. Scalibor collare può essere considerato come parte di un programma di prevenzione dell'infezione da *Leishmania infantum*. Per ottenere una protezione completa nei confronti di zecche, pulci, flebotomi e zanzare, si consiglia di sostituire Scalibor collare dopo 4 mesi dalla prima applicazione, mantenendo il collare costantemente indossato da aprile ad ottobre. Non utilizzare nei gatti. Utilizzare nei cuccioli di età superiore alle 7 settimane.



**Exspot** è una soluzione spot on per cani. L'uso regolare di Exspot, ad intervalli mensili, elimina zecche, pulci, flebotomi, zanzare, mosche e pidocchi e assicura una protezione dalla reinfestazione fino a quattro settimane. Exspot è disponibile in due presentazioni:

- 6 pipette da 1ml
- 6 pipette da 2ml

Per ulteriori informazioni consultare il foglietto illustrativo.

Solo per uso esterno. Non utilizzare nei gatti. L'uso nei cuccioli è consentito a partire dalle 2 settimane d'età. Non utilizzare durante l'allattamento, per l'utilizzo in gravidanza consultare il Veterinario.



## Istruzioni per l'uso

Posizionare e regolare il collare attorno al collo del cane senza stringerlo. Inserire l'estremità del collare nella fibbia. Assicurarsi che passino due dita tra il collare e il collo del cane. Tagliare la parte eccedente, lasciandone circa 5 cm dalla fibbia. Il contatto del collare con la cute del cane è essenziale per permetterne l'azione.

Dopo l'applicazione del collare lavarsi le mani con acqua fredda e sapone.

Leggere attentamente tutte le istruzioni presenti sulla confezione e sul Foglio Illustrativo.



**SCALIBOR collare** è indicato per prevenire l'infestazione da zecche per 6 mesi, da pulci per 4 mesi oltre a prevenire la puntura dei flebotomi per 5 mesi e delle zanzare per 6 mesi. L'effetto repellente (*anti-feeding*) di SCALIBOR nei confronti dei flebotomi consente di ridurre il rischio di trasmissione di leishmaniosi viscerale rappresentando un utile strumento nel programma di prevenzione dell'infezione da *Leishmania infantum*.

Per ottenere una protezione completa nei confronti di zecche, pulci, flebotomi e zanzare, si consiglia di sostituire Scalibor collare dopo 4 mesi dalla prima applicazione, mantenendo il collare costantemente indossato da aprile ad ottobre.

La piena attività del collare SCALIBOR viene raggiunta 1 settimana dopo l'applicazione pertanto si suggerisce di applicare il collare 1 settimana prima che gli animali vengano introdotti in un ambiente infestato.

Il bagno non pregiudica l'efficacia del collare

Non utilizzare nei gatti. Utilizzare nei cuccioli di età superiore alle 7 settimane.



**Exspot** è una soluzione spot on per cani. L'uso regolare di Exspot, ad intervalli mensili, elimina zecche, pulci, flebotomi, zanzare, mosche e pidocchi e assicura una protezione dalla reinfestazione fino a quattro settimane.

Exspot è disponibile in due presentazioni:

- 6 pipette da 1ml
- 6 pipette da 2ml

La piena attività di Exspot viene raggiunta nell'arco delle 24 ore.

Istruzioni per l'uso:

a) Cani di peso compreso tra i 2,5 kg e i 14 kg:

1 pipetta da 1 ml, pari a una dose massima di permetrina di 286 mg/kg (cani di 2,5 kg) e minima di 51 mg/Kg (cani di 14 kg).

Applicare in corrispondenza dell'area delimitata dalle due scapole.

b) Cani di peso compreso tra i 15 e i 29 Kg:

2 pipette da 1 ml, pari a una dose massima di permetrina di 95,3 mg/kg (cani di 15 kg) e minima di 49,3 mg/Kg (cani di 29 kg), oppure, in alternativa, 1 pipetta da 2 ml.

Applicare il prodotto in due punti differenti lungo la linea dorsale, uno tra le due scapole e l'altro sulla regione della groppa, in corrispondenza della base della coda.





c) Cani di peso compreso tra i 30 e i 40 Kg:

3 pipette da 1 ml, pari a una dose massima di permetrina di 71,5 mg/kg (cani di 30 kg) e minima di 53,6 mg/Kg (cani di 40 kg).

Applicare il prodotto in tre punti differenti lungo la linea dorsale, partendo dalla regione delimitata dalle due scapole sulla regione della groppa, in corrispondenza della base della coda.

d) Cani di peso superiore a 41 kg fino a 55 kg:

2 pipette da 2 ml, pari a una dose massima di permetrina di 69,7 mg/kg (cani di 41 kg) e minima di 52 mg/Kg (cani di 55 kg).

Applicare il prodotto in quattro punti differenti lungo la linea dorsale, partendo dalla regione delimitata dalle due scapole sulla regione della groppa, in corrispondenza della base della coda.

Per tutte le tipologie di cani descritte qui sopra premere le pipette con fermezza, fino a svuotarne l'intero contenuto direttamente sulla cute del dorso avendo cura che il prodotto non coli sul pelo.

Solo per uso esterno. Non utilizzare nei gatti. L'uso nei cuccioli è consentito a partire dalle 2 settimane d'età. Per ulteriori informazioni consultare il foglietto illustrativo. Non utilizzare durante l'allattamento, per l'utilizzo in gravidanza consultare il Veterinario.

